Universidade Veiga de Almeida
Centro de Ciências Biológicas da Saúde
Curso de Graduação em Enfermagem – Campus Tijuca

El uso del condón entre los hombres jóvenes que tienen relaciones sexuales con hombres que frecuentan los clubes gay en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil

Vinícius R. F. da Fonte; Carina D. P. Pinheiro; Nathália S. Barcellos; Cristiane M. A. Costa; **Marcio T.R. Francisco;** Thelma Spindola

Contacto: mtadeu@uva.br

Introducción

Justificación

Datos del Ministerio de Salud – Brasil muestran un aumento en la prevalencia de infección por VIH entre los HSH jóvenes 17 y 22 años.1

Otro estudio muestra que los HSH jóvenes mantienen más relaciones sin condones, en comparación con la población masculina general.2

También se observó que los HSH jóvenes mantienen un mayor número de parejas sexuales casuales.3

Problema

¿Cuáles son los factores que se asocian o no al uso del condón entre los HSH, adultos jóvenes, que frecuentan los clubes gay en la ciudad de Rio de Janeiro?

Objetivo

Describir los factores que se asocian o no al uso del condón entre los HSH, jóvenes adultos, que frecuentan los clubes gay en la ciudad de Rio de Janeiro.

Pertinencia

El impacto de la epidemia en la población de HSH y la falta de estudios, acciones y políticas a este grupo, que socialmente, sufren la acción de los prejuicios, la discriminación y la invisibilidad social.4

METODOLOGIA

f

Se realizó un estudio descriptivo y exploratorio, cuantitativo y cualitativo.

g

Escenário

Discotecas LGBT en la ciudad de Rio de Janeiro.

Sujetos

HSH, jóvenes adultos de 18-24 años que frecuentan discotecas LGBT.

Recopilación de datos

220 personas fueron entrevistados mediante un cuestionario anónimo con 19 preguntas abiertas y cerradas.

La recolección de datos cumple con la Resolución 196/965 con el CAAE 07285912.4.0000.5291 de el Comité de Ética de la Universidad Veiga de Almeida.

Análisis de Datos

Los datos fueron analizados por frecuencia simple y porcentaje del total para el análisis cuantitativo utilizando el software de Epiinfo y el punto de vista cualitativo usamos el marco del análisis de Bardin.

i

RESULTADOS

Características socioeconómicas:

La mayoría de los encuestados se encontró con más de 20 años de edad (21,4%), se consideraban homosexuales (38,7%), católicos (31,8%), empleados (70%), tenía un ingreso familiar entre 3 y 5 sueldos mínimos (31,4%), que asisten a la educación superior (50,9%), no estaban en una relación estable (71,8%).



j

El uso de preservativos durante las relaciones sexuales entre adultos jóvenes HSH, asistentes de discotecas LGBT de la ciudad de Río de Janeiro. Río de Janeiro, 2012. (N = 220)

Uso do preservativo	F	%
Sexo Oral		
Si	11	5
No	166	75,4
A veces	25	11,4
Sin respuesta	18	8,2
Primeira relacíon sexual		
Si	126	57,3
No	73	33,2
Sin respuesta	21	9,5
Última relacíon sexual		
Si	126	57,3
No	73	33,2
Sin respuesta	21	9,5

Factores que están asociados con no usar preservativos:

Sexo oral: Molestias, disminución del placer, sabor del condon, la confianza en la pareja no percepción del riesgo.

Primeira relación sexual: La falta de experiencia y/o conocimiento, el momento; olvidar / no tener, la confianza en la pareja.

Última relación sexual: Confianza en pareja; momento, las preferencias personales, olvidar / no tener.

Factores que están asociados con el uso de preservativos

Sexo oral: Prevención de EST/Sida; placer

Primeira relación sexual: Prevención de EST/Sida; la falta de confianza; imposición de la pareja.

Última relación sexual: Prevención de EST/Sida; falta de confianza en su pareja, algunos de los encuestados fueron incapaces de explicar por qué se utilizaron el preservativo.

conclusíon

En estos 30 años de la epidemia la infeccíon por VIH/SIDA entre hombres gays sigue siendo un desafío para la salud pública en Brasil, este grupo de población sigue sufriendo de la invisibilidad social y las respuestas al problema siguen siendo tímidos.

Es necesario continuar con las acciones preventivas dirigidas a este público, con la distribución de folletos, preservativos, y materiales de información, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de este grupo.

m

n

Referencias

1. Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento Nacional de DST/Aids e Hepatites Virais. Boletim Epidemiológico AIDS/DST. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.

2. Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento Nacional de DST/AIDS e Hepatites Virais. Jovens gays usam menos preservativo, diz estudo: Trabalho do Ministério da Saúde ajuda a explicar por que há mais casos de AIDS por transmissão HOMOSSEXUAL que hetero. [Internet]. Brasília: Departamento Nacional de DST/AIDS e Hepatites Virais; [atualizada em 2010 Jun 18; acesso em 2012 Jun 10]. Disponível em: http://www.aids.gov.br/noticia/jovens-gays-usam-menos-preservativo-diz-estudo

3. Jornal Brasil. Pouco uso de preservativo entre jovens gays é alerta para intensificar prevenção. [Internet]. [atualizado em 2010 Jun 18; acesso em 2012 Jun 13]. Disponível em: http://www.jornalbrasil.com.br/interna.php?autonum=10465

4. Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA). Levantamento de necessidades em HIV/AIDS na população homossexual do Grande Rio: Jovens de 18 a 24 anos e homens soropositivos. Rio de Janeiro: ABIA, 2008.

5. BRASIL, Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde (CNS). Resolução no. 196/96. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília: CNS 1996.

GRACIAS!